

Dětský očkovací kalendář v ČR

Věk dítěte	Povinné očkování		Nepovinné očkování	
	NEMOC	OČKOVACÍ	NEMOC	OČKOVACÍ LÁTKA
od 4. dne nejpozději 6. týdne	Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí)	BCG 10		
od 6. týdne			Rotavirové	Rotarix, Rotateq (1. dávka)
od 9 týdne (2. měsíce)	Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná	Hexa vakcína (1. dávka)	Pneumokoko vá onemocnění	Synflorix, Prevenar 13, Vaxneuvance (1. dávka)
2-3 měsíce			Meningokok	Bexsero (1.dávka)
			Rotavirové nákazy	Rotarix, Rotateq (2. dávka- měsíc po 1. dávce)
4. měsíce	Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná	Hexa vakcína (2. dávka-2 měsíce po 1. dávce)	Pneumokoko vá onemocnění	Synflorix, Prevenar 13, Vaxneuvance (2. dávka- 2 měsíce po 1. dávce)
			Rotavirové nákazy	Rotateq (3. dávka- měsíc po 2. dávce)
4 -6 měsíců			Meningokok	Bexsero (2.dávka)
13. měsíc	Spalničky, zarděnky,	MMR VAXPRO (1. dávka)		
mezi 11.-13. měsícem	Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná	Hexa vakcína (3. dávka)	Pneumokoko vá onemocnění	Synflorix, Prevenar 13, Vaxneuvance (3. dávka-ve věku 11 až 15 měsíců)
12.-15.měsíc			Meningokok	Bexsero (3.dávka)
do 2 let věku			Meningokok ová	Nimenrix
od dovršení 5. do dovršení 6. roku	Spalničky, zarděnky,	MMR Vaxpro (2. dávka)		
od dovršení 5. do dovršení 6. roku	Záškrt, tetanus, černý kašel	Boostrix (přeočkování)		
v 10 letech věku dítěte	Záškrt, tetanus, černý kašel,	Adacel polio (přeočkování)		
od dovršení 13. do dovršení 14. roku			Onemocnění lidským	Cervarix, Gardasil 9 (2 dávky)
od dovršení 14. do dovršení 15. roku			Očkování proti meningokok	Bexsero, Nimenrix

Další doporučená očkování

Věk dítěte	Nemoc	Očkovací	Poznámky
od 12.měsíce	Klíšťová encefalitida	FSME junior /adult	Přeočkování po měsíci ->

Od 9.měsíce	Plané neštovice	Varilrix	ideálně před nástupem do kolektivu nebo v případě, že se onemocnění neobjeví do 14 let věku.	Aplikovány jsou 2 dávky v odstupu 6 týdnů
Od 1 roku	Žloutenka typu A	Havrix	Celoživotní ochrana	Aplikovány jsou 2 dávky v odstupu minimálně 6 měsíců